

**HNOJIVO ES** Kapalné NP hnojivo 10,5-10,5

10,5 % (v/v) N celkový	vodorozpustný celkový dusík	126 g/l
9,3 % (v/v) N močovinový	vodorozpustný amidický dusík	112 g/l
1,2 % (v/v) N amonný	vodorozpustný amonný dusík	14 g/l
10,5 % (v/v) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	vodorozpustný oxid fosforečný	126 g/l

**Výrobce:** AGRA GROUP a.s.,

Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

**Obsah balení:** 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů)

**Podmínky skladování:** Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **36 měsíců** od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 20 dm<sup>3</sup> - 3 vrstvy • kontejner 1 m<sup>3</sup> - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Garant P** se zvýšeným stimulačním účinkem je určeno plodinám náročným na fosfor nebo tam, kde je příjem této živiny kořeny omezen (půdy málo zásobené nebo kyselější, popř. alkalické, kde je příjem fosforu blokován).

Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

**Rozsah a způsob použití:** Hektarová dávka: **12 kg / ha** (tj. 10 litrů / ha)

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Nestříkáme porosty přehnojené dusíkem.
5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokořenové výživy rostlin nemůže dostatečně projevit.

**Doporučené aplikace listových hnojiv CAMPOFORT® dle AVS (aktuální výživný stav rostlin):**

Plodina	Vývoj. fáze BBCh (BBA, Eichhorn)	kombinace s	hekt. dávka hnojiva / optim. množství vody
obiloviny	25 - 61	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 120 lt. až 300 lt.
řepka, sója, hořčice	33 - 61	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 120 lt. až 300 lt.
brambory, cukrovka, luskoviny	39 - 75	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 150 lt. až 300 lt.
vinná réva	26 - 38	herbicidey, insekticidey	12 kg (10 lt.) CF / 500 lt. až 1000 lt.
chmel, ovocné plodiny, zelenina	45 - 81	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 400 lt. až 2000 lt.
mák setý	16 - 61	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 200 lt. až 300 lt.
slunečnice	31 - 39	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 200 lt. až 300 lt.
kukuřice	18 - 32	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 120 lt. až 300 lt.

Obsah rizikových prvků v hnojivu

nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.

(Cd &lt; 50 mg/kg • Pb &lt; 15 mg/kg • Hg &lt; 1 mg/kg • As &lt; 10 mg/kg • Cr &lt; 150 mg/kg).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

**První pomoc: Při zasažení očí:** okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí:** vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.