

POUŽITÍ ZEJMÉNA VE VLHKÝCH  
PODMÍNKÁCH

VOSKOVANÁ  
GRANULOVANÁ  
NÁSTRAHA

NORAT ATG

NORAT ATG

NORAT ATG

NORAT ATG

NORAT ATG

VOSKOVANÉ GRANULE PRO HUBENÍ ŠKODLIVÝCH HLODAVCŮ JEDNORÁZOVÝM PŘÍJMEM. POUŽITÍ V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (ATRAKTIVNÍ SLOŽENÍ ZEJMÉNA PRO MYŠI V MÍSTECH SKLADOVÁNÍ ZELENINY, OVOCE APOD.) NEBO V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI.

**Účinná látka:**

0,005% brodifacoum (50 miligramů v 1 kg nástrahy)

**Složení:**

0,001% denatonium benzoate (hořké činidlo)  
30,00% parafin (vosk)  
69,994% atraktivní nástrahový materiál (obilí, sušená mrkev, cukr a další pojiva a atraktanty).

Přípravek obsahuje hořké činidlo zmírňující riziko nežádoucího požití člověkem. Parafinový obal zaručuje delší trvanlivost nástrahy ve vlhkých podmínkách.

- S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
- S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
- S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
- S24 Zabraňte kontaktu s pokožkou.
- S35 Používejte vhodné rukavice.
- S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5° až 40°C.
- S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
- S49 Uchovávejte pouze v původním obalu.
- S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVANÝ A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRÁVU**

Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum! Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, ale i ptáky a divoce žijící zvířata! Nutná ochrana vodních zdrojů! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! Zákaz používání přípravku ve volné přírodě! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití! Před použitím přečtěte návod k použití!

**Mechanismus účinku:**

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne vnitřním vykrvácením. Přípravek působí již jednorázovým použitím (po několika granulích), je velmi dobře přijímán a úhyn nastává mezi 3 - 10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

**Návod na použití:**

Nástrahu v uvedeném množství nasypeme pomocí lžičky k tomu určené k děrám, norám nebo na místa nejvíce navštěvovaná hlodavci do jedových staniček, nebo uzavřených bedniček s otvory, drenážních trubek nebo skryté za cihlu nebo jiný materiál, abychom zabránili styku nástrahy s necílovými organismy, zejména dětmi a domácími zvířaty. Účinné a hospodárné je vykládat po asanované ploše větší množství menších hromádek nebo větší počet jedových staniček než naopak. Nástrahy doplňujte vždy za 8-10 dnů, a to tak dlouho, dokud trvá jejich odběr.

**Dávkování:**

**Potkan, krysa:** 20-60 g, tj. cca 16-40 granulí  
**Myš domácí:** 5-20 g, tj. cca 4-16 granulí  
**Hryzec vodní:** 1 granulí pouze do „aktivní“ nory, vloženou do drenážní trubky či jinak chráněnou na několik míst několik granulí ve vzdálenosti 10 metrů, při velkém výskytu 5 metrů

**Uvnitř krabičky je vložen letáček s dalšími informacemi a zásadami použití.**

**Dodavatel:**

**PelGar s.r.o.**  
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10  
Telefon: 274 770 944, 274 770 063, 608 923 215, 602 219 959  
Fax: 274 770 944, 274 783 078  
E-mail: info@pelgar.cz • www.pelgar.cz



**Výrobce:**


Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí  
**AGROCHEMA družstvo STUDENEC**  
675 02 Koněšín, okres Třebíč.

**Hmotnost: 300 g**



Číslo výrobní šarže: uvedeno na krabičce  
Datum výroby: uvedeno na krabičce

300 g



**VOSKOVANÁ  
RODENTICIDNÍ NÁSTRAHA**

**Bezpečnostní opatření:**

Při práci s nástrahou používejte ochranný oděv a gumové rukavice a boty. Při práci není dovoleno jíst, pít nebo kouřit. Po práci a před jídlem se důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem.

**Příznaky otravy:**

Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

**První pomoc:**

Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami mediálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal a letáček.

Při zasažení pokožky: odstranit zasažený oděv, důkladně se omýt tekoucí vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: vyplachovat proudem čisté tekoucí vody podobu 5-10 minut.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. Antidotem proti působení brodifacoumu je vitamin K1-KANAVIT.

**Jeho dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možné konzultovat s Klinikou nemocí z povolání:**

**Klinika pracovního lékařství**  
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575  
E-mail: tis@vfn.cz

**Skladování:**

NORAT ATG se skladuje v původních neporušených obalech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce. Nástrahy chraňte před přímým slunečním světlem a vlhkem. Skladujte při teplotě +5°-40°C.

**Likvidace obalů:**

Prázdnou krabičku a polyethylenový sáček po důkladném vyklepání lze likvidovat v komunálním odpadu.

**Doba použitelnosti:**

Při předepsaném způsobu skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Norat ATG je oznámen na MZ pod čj. 3371 - 07. 05. 03/12565 a povolen pod HEM-381- 24.2.00/8197

Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u výrobce, dodavatele nebo na [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz)

NORAT je registrovanou ochrannou známkou TransChem s.r.o. ČR

Biodicinný přípravek podle §35 zákona č. 120/2002 Sb.

ÚSKVBL schválení pro použití v potravinářském průmyslu pod čj. 2/2004

