

POMOCNÝ PROSTŘEDEK PRO MOŘENÍ OSIVA.

Peridiam[®] Quality 013

Pasivní pomocný prostředek červené barvy ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro zvýšení přilnavosti mořidel na osivu, snížení jejich otěru při transportu a manipulaci a pro zvýraznění barevnosti osiva.

Účinná složka:	směs polymerů a pigmentů
-----------------------	---------------------------------

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Držitel rozhodnutí o zápisu do úředního registru:	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D-51373 Leverkusen, Německo
Výrobce:	Bayer S.A.S. 14 rue de la Pierre-Follège, F-91660 Méréville, Francie
Právní zástupce v ČR/dodavatel:	BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5; tel.: 266 101 111

[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:	1714-1C
Balení a obsah:	HDPE-kanystr 5 L; 10 L HDPE-sud 200 L HDPE-kontejner 500 L; 1000 L
Datum výroby: Číslo šarže:	uvedeno na obalu uvedeno na obalu
Použitelné do:	2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních neporušených obalech Pomocný prostředek na ochranu rostlin, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor pomocného prostředku pro tento účel zajistí vlastník pomocného prostředku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pomocného prostředku.

Působení

Peridiam Quality 013 je pasivní pomocný prostředek, který zlepšuje technologické vlastnosti namořeného osiva. Přispívá k rovnoměrnějšímu rozmístění mořidel na vnějším povrchu semen a optimalizuje jejich přilnutí na osivu. Hladší povrch ošetřeného osiva zlepšuje jeho syponost a redukuje možnost otěru osiva při transportu a manipulaci. Namořené osivo se vyznačuje nižší prašností a zvýšenou barevností.

Návod k použití

Plodina	Účel použití	Dávkování	OL	Poznámka
pšenice, ječmen, žito, tritikale	zlepšení technologických vlastností osiva	1,5 l/t osiva	AT	určeno pro moření s mořidly společnosti Bayer

OL (ochranná lhůta) – není nutné stanovit

Upřesnění podmínek aplikace

Peridiam Quality 013 lze použít pouze v souladu s návodem k použití příslušného mořidla. Aplikuje se v průběhu moření osiva a v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro moření osiva obilnin a na k tomuto účelu vhodných mořících zařízeních. Peridiam Quality 013 se míchá s mořidly a vstupuje do moření ve formě tank-mixu. Osivo ošetřené Peridiamem Quality 013 nedoporučujeme opětovně mořit.

Při přípravě směsi se do cca 80 % plánovaného množství vody přidá za stálého míchání Peridiam Quality 013 a míchá se po cca 10 minut. Poté se do směsi přidají mořidla. Nejprve se přidávají tekutá mořidla, poté prášková. Nakonec se přidá zbývající množství vody, kterou se propláchnou nádoby od použitých přípravků. Znovu se míchá 10 minut a potom se zahájí dávkování mořící směsi. Mořící směs je nutno homogenizovat mícháním po celou dobu moření. Připravenou směs je nutno bezodkladně spotřebovat.

Čištění mořícího zařízení

Provádí se v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro daný typ mořičky.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

SP1	<i>Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)</i>
------------	--

Podmínky správného skladování

Pomocný prostředek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 0 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Odstraňování obalu, neupotřebitelných zbytků, mořící kapaliny a oplachových vod

Případné zbytky mořící kapaliny nebo oplachové vody se likvidují podle pokynů pro dané mořidlo, se kterým byl pomocný prostředek použit.

Použité obaly od pomocného prostředku se nesmějí používat k jinému účelu!

Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění.

Případné nepoužité zbytky pomocného prostředku se rovněž předají oprávněné osobě k odstranění.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka

Při moření použijte osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) doporučené pro mořidlo, se kterým se pomocný prostředek používá.

Při práci se samotným pomocným prostředkem použijte gumové nebo plastové rukavice, pracovní ochranný oděv a pracovní obuv.

Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit!

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím důkladně omyjte a vyperte.

První pomoc

Dodržujte pokyny pro první pomoc pro dané mořidlo, se kterým se pomocný prostředek používá.

Při manipulaci se samotným pomocným prostředkem dodržujte tyto pokyny:

Všeobecné pokyny: *Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety nebo bezpečnostního listu.*

Při náhodném požití – vypláchnout ústa čistou vodou, nevyvolávat zvracení

Při nadýchání – přerušte expozici, přejděte na čerstvý vzduch

Při zasažení očí - ihned vyplachujte oči velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody alespoň po dobu 15 minut, vyjměte kontaktní čočky, pokud je používáte, poté pokračujte ve vyplachování. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku, apod.) vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu použít a je třeba je zlikvidovat

Při zasažení kůže - zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Pokožku dobře opláchněte

Při vyhledávání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - **Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz).**

Dodatková informace společnosti Bayer:

Pomocný prostředek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.

Pomocný prostředek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu této etikety anebo v písemných doporučeních společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.

V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek.

Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním pomocného prostředku.