

HNOJIVO ES

**Hnojivo NK(Mg) – suspenzní
20-15-(4) se stopovými živinami
pro listovou výživu**

OBSAH ŽIVIN

| % hmotnosti | Živina |
|----------------|--|
| 20,0 | Dusík (N) - celkový |
| 4,3 | - dusičnanový dusík |
| 15,2 | - močovinový dusík |
| 15,0 | vodorozpustný oxid draselný (K ₂ O) |
| 4,0 | vodorozpustný oxid hořečnatý (MgO) |
| 0,02 | Bór (B) |
| 0,05 | Měď (Cu) v chelátu s EDTA |
| 0,1 | Železo (Fe) v chelátu s EDTA |
| 0,05 | Mangan (Mn) v chelátu s EDTA |
| 0,001 | Molybden (Mo) |
| 0,05 | Zinek (Zn) v chelátu s EDTA |

WUXAL®
SUSPENSION
KOMBI Mg

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

NK suspenzní hnojivo s hořčíkem a stopovými prvky (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pro použití zejména ve chmelu, polních plodinách, ovocnářství, ve vinné révě, v okrasných rostlinách a zelenině. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování.

DÁVKOVÁNÍ A POKYNY PRO POUŽITÍ

Wuxal SUS Kombi Mg NK 20-15 + 4 MgO je vysoce koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pro aplikaci na list. Přípravek je možné použít ve všech polních plodinách, v ovocnářství, zelinářství i v okrasném zahradnictví, obzvláště tehdy, kdy je v půdě k dispozici dostatečná zásoba fosforu a rostliny mají zvýšené nároky na hořčík. Může být použit jak preventivně, tak i kurativně, po projevení se příznaků nedostatku hořčíku.

V obilninách je vhodné použít Wuxal SUS Kombi Mg – 2–4x a to v období od odnožování až do metání, dávka 3–5 l/ha.

V kukuřičce se hnojivo aplikuje 3x v období mezi fází 2–11 listů, dávka 3–5 l/ha.

V bramborách se aplikuje 3x, poprvé počátkem tvorby pupat (fáze 50), opakuje se počátkem květu a 14 dní poté.

Dávka 5 l/ha.

V cukrovce a krmné řepě se aplikuje 3–5x od fáze 4 listů do uzavření řádků, dávka 5 l/ha.

Zelinářství – aplikuje se v koncentraci 0,05–0,1 % (50–100 ml na 100 l vody) podle potřeby v kombinaci s běžnými pesticidy.

Okrasné rostliny – aplikuje se v koncentraci 0,05 – 0,1 % (50 – 100 ml na 100 l vody) v kombinaci s běžně používanými pesticidy. V mladších rostlinách a kulturách s měkkými, jemnými listy je vhodné použít spodní hranici uvedeného koncentrace.

Chmel – v koncentraci 0,15% se kombinuje s ošetřením proti peronospoře. Při použití úsporných postřiků nesmí koncentrace převyšit 0,3%. Při zvýšené potřebě dávkování zinku lze Wuxal Sus Kombi Mg používat ve směsi se síranem zinečnatým (0,2 %). Ošetřuje se 2–4x. Ošetření lze rovněž kombinovat s Wuxalem Super (3–5 l/ha).

Ovocnářství – aplikace 2–3x v dávce 3–5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy, poprvé v růstové fázi těsně před vytvořením růžového poupěte (E2). V jabloních se v době po odkvětu doporučuje přejít na Wuxal SUS Kombi Ca.

Vinařství – aplikace v dávce 3–5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy proti peronospoře, celkem 5x.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍHO ROZTOKU

Produkt je třeba v obalu nejprve pečlivě rozmíchat a poté se vlije přes sítko do nádrže a spláchně vodou. Při rozpouštění je třeba udržovat míchadlo neustále v činnosti. Hnojivo lze rovněž přímo v obalu či v pomocné nádobě rozmíchat s vodou a vpravit do nádrže. Poté se za míchání doplní vody na stanovený objem.

Při přípravě směsi s pesticidy se do nádrže vždy vpraví jako první Wuxal a teprve poté se předepsaným postupem dávákuje příslušný pesticid.

MÍSITELNOST

Produkt je fyzikálně a chemicky mísitelný s fungicidy i insekticidy, běžně se nacházejícími na trhu, nedoporučujeme jej však používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeauxské nebo sírovápenaté jichy a s polysulfidy.

Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí Wuxal s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI

Produkt je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte produkt před mrazem, teplotami pod +5 °C a nad 40 °C, znečištěním a vyschnutím. Neuchovávejte v kovových obalech (riziko koroze). I krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5 °C může dojít ke změně barvy a vyloučení krystalů. Tato skutečnost není na závadu jeho jakosti, při přípravě aplikační kapaliny dojde ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobku při teplotách okolo 20 °C za občasného promíchání či protřepání.

VAROVNÉ OZNAČENÍ, POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI LIDÍ A K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů klasifikován.

Při používání nejezte a nepijte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omýjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti výparům/aerosolům a v případě vytvoření vlhké mlhy. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Materiál sám o sobě není nebezpečný a také sotva vznítitelný. V případě okolního ohně se můžou uvolnit nebezpečné zplodiny. V případě že se v ohni nachází větší množství hnojiva můžou se tvořit plyny dusíku a amoniaku. Eventuelní požár je možné hasit postřikem vodou, oxidem uhličitým, chemickou hasební pěnou, chemickým hasebním práškem. Vodu lze použít pro chlazení obalu ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a zejména zasáhnout zemědělskou půdu.

PRVNÍ POMOC

Při styku s kůží: Svlekněte kontaminovaný oděv. Postiženou část kůže neprodleně důkladně omýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. V případě potřeby přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Důkladně vymýt oči při plném otevření očních víček pod tekoucí vodou (chraňte nezasažené oko, sundejte kontaktní čočky). V případě potřeby přivolejte očního specialistu.

Při náhodném požití: Okamžitě vypláchněte postiženému ústa vodou a následně podejte velké množství vody. V případě přetrvávajících potíží přivolejte lékaře.

Při vdechnutí výparů nebo aerosolů: Pacienta okamžitě vynesť ze zamořeného místnosti a nechat jej odpočívat na dobře větraném místě. Lékařské vyšetření je potřebné jestliže postižený má problémy s dýcháním.

Množství: 100 l – 150 kg NETTO

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo vyrobené šarže: uvedeno na obalu

WKMG 100L CZ100216

**150 kg
100 l**

AGRO ALIANCE

Distributor: Agro Alliance spol. s r.o.
252 26 Třebotov 304, tel: 257 830 137-8

AGLUKON
THE HOUSE OF BRANDS

Výrobce:

AGLUKON
Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdtter
Landstr. 199 D-40549 Düsseldorf, Německo